

Warnhinweis: Korrekturen

Aktuell vom 25.02.2019

KINDERSICHER
T.O. ZUGCK

Durch folgende Änderungen und Anpassungen haben wir den Infoflip aktualisiert. Leider haben sich auch folgende Fehler eingeschlichen, die in den meisten Exemplaren schon korrigiert wurden.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, kontrollieren Ihren Infoflip und verbessern die aufgeführten Aktualisierungen, z.B. mit einem wasserfesten, desinfektionsmittelbeständigem Folienstift.

Falls Sie nicht an Ihrem Infoflip herumbasteln wollen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir senden Ihnen gern eine aktuelle Auflage zum Selbstkostenpreis zu: info@kindersicher.me

12. sowie alle vorangegangenen Auflagen

- Die Farbskala der Lund & Browder-Tafel ist nicht maßstäblich: hier gilt das angegebene Alter. Die korrigierte Tabelle unten können Sie ausdrucken und darauf gleich die %verbrannter Körperoberfläche berechnen

10. Auflage

- Grau, Rosa, Rot: Larynxtuben können für Kinder < 10 Kg nicht mehr uneingeschränkt empfohlen werden
- Die Dosierung für **Ketanest S i.m./i.n.** ist mit 2 mg/kg für Verbrennungspatienten und Polytraumatisierte sehr hoch angegeben. Bei isolierten Verletzungen beginnen sie daher i.m./i.n. besser mit **0,5 mg/kg**. Zur Analgesie mit **Ketanest S i.v.** sollten Sie mit **0,25 mg/kg** beginnen und nach Wirkung titrieren

4. Auflage

- Gelb, Kasten Notfall/ Rea, Spalte Flumazenil (Anexate): Korrekte Dosis = **1,3 ml** statt 3,3 ml

3. Auflage

- Weiss bis Grün Kasten Narkose/ Krampf, Spalte Diazepam Rectiole = Diazepam **10** statt 5 Rectiole
- Gelb, Kasten Notfall/ Rea, Spalte Naloxon: Korrekte Dosis = **3,2 ml** statt 1,3 ml


2. Auflage (ergänzend zu den oben angeführten Korrekturen)

- Grau 5 Kg Kasten Narkose/ Krampf, Spalte Sufentanil: Konzentration = **0,5 ug** anstatt 1 ug/ml
- Rosa, Kasten Notfall/ Reanimation: Adenosin Rosa: 0,65 mg = **0,22 ml** anstatt 0,65 ml.
- Gelb, Kasten Analgesie, Spalte Morphin. Die korrekte Dosis sind 1.3 mg = **1,3 ml** statt 0,65 ml

1. Auflage (ergänzend zu den oben angeführten Korrekturen)


- Unter Perfusoren/ Disoprivan (Propofol) 1% lautet die korrekte Einheit 5-10 **mg/kg/h** in allen Farbbereichen!
- Grün, Orange, Spalte Ketanest S 25 mg/ml i.m./i.n.: Konzentration 25 mg/ml pur („+ 4 ml NaCl“ streichen!)
- Rosa, Perfusoren/ Remifentanil (Ultiva) ist die korrekte Konzentration: 5 mg/50 ml NaCl = **100 µg/ml**

Wir bedauern, dass es trotz größter Sorgfalt zu diesen Fehlern gekommen ist und entschuldigen uns bei allen KINDERSICHER-Anwendern. Wenn Sie die genannten Korrekturen durchgeführt haben, ist Ihr Infoflip wieder aktuell und...Kindersicher!



Berechnung verbrannter Körperoberfläche (KOF)
korrigierte Lund & Browder Tafel

| Alter/Größe | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
|--------------------|----|----|----|----|----|
| %KOF | | | | | |
| A Kopf vorn/hinten | 9½ | 8½ | 6½ | 5½ | 4½ |




| Alter/Größe | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| %KOF | | | | | |
| B ½ Oberschenkel | 2¾ | 3¼ | 4 | 4½ | 4½ |
| C ½ Unterschenkel | 2½ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ |

Hautrötungen und Verbrennungen I° nicht mitrechnen.

| Region | % KOF | |
|--------------|-------|------|
| | II° | III° |
| Kopf | | |
| Hals | | |
| Rumpf vorne | | |
| Rumpf hinten | | |
| rechter Arm | | |
| linker Arm | | |
| Gesäß | | |
| Genitalien | | |
| rechtes Bein | | |
| linkes Bein | | |
| Summe | | |

Berechnung verbrannter Körperoberfläche (KOF)
korrigierte Lund & Browder Tafel

| Alter/Größe | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
|--------------------|----|----|----|----|----|
| %KOF | | | | | |
| A Kopf vorn/hinten | 9½ | 8½ | 6½ | 5½ | 4½ |



| Alter/Größe | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| %KOF | | | | | |
| B ½ Oberschenkel | 2¾ | 3¼ | 4 | 4½ | 4½ |
| C ½ Unterschenkel | 2½ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ |


Hautrötungen und Verbrennungen I° nicht mitrechnen.

| Region | % KOF | |
|--------------|-------|------|
| | II° | III° |
| Kopf | | |
| Hals | | |
| Rumpf vorne | | |
| Rumpf hinten | | |
| rechter Arm | | |
| linker Arm | | |
| Gesäß | | |
| Genitalien | | |
| rechtes Bein | | |
| linkes Bein | | |
| Summe | | |



Berechnung verbrannter Körperoberfläche (KOF)
korrigierte Lund & Browder Tafel

| Alter/Größe | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
|--------------------|----|----|----|----|----|
| %KOF | | | | | |
| A Kopf vorn/hinten | 9½ | 8½ | 6½ | 5½ | 4½ |




| Alter/Größe | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| %KOF | | | | | |
| B ½ Oberschenkel | 2¾ | 3¼ | 4 | 4½ | 4½ |
| C ½ Unterschenkel | 2½ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ |

Hautrötungen und Verbrennungen I° nicht mitrechnen.

| Region | % KOF | |
|--------------|-------|------|
| | II° | III° |
| Kopf | | |
| Hals | | |
| Rumpf vorne | | |
| Rumpf hinten | | |
| rechter Arm | | |
| linker Arm | | |
| Gesäß | | |
| Genitalien | | |
| rechtes Bein | | |
| linkes Bein | | |
| Summe | | |

Berechnung verbrannter Körperoberfläche (KOF)
korrigierte Lund & Browder Tafel

| Alter/Größe | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
|--------------------|----|----|----|----|----|
| %KOF | | | | | |
| A Kopf vorn/hinten | 9½ | 8½ | 6½ | 5½ | 4½ |



| Alter/Größe | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| %KOF | | | | | |
| B ½ Oberschenkel | 2¾ | 3¼ | 4 | 4½ | 4½ |
| C ½ Unterschenkel | 2½ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ |

Hautrötungen und Verbrennungen I° nicht mitrechnen.

| Region | % KOF | |
|--------------|-------|------|
| | II° | III° |
| Kopf | | |
| Hals | | |
| Rumpf vorne | | |
| Rumpf hinten | | |
| rechter Arm | | |
| linker Arm | | |
| Gesäß | | |
| Genitalien | | |
| rechtes Bein | | |
| linkes Bein | | |
| Summe | | |